



Argusvlinder



Boomblauwtje



Icarusblauwtje



Distelvlinder



Gehakkelde aurelia



Oranjetipje



Bruin blauwtje



Zwartsprietdikkopje



Kleine vos



Atalanta



Dagpauwoog



Hooibeestje



Landkaartje



Bont zandoogje



Kleine vuurvlinder



Groot koolwitje



Klein koolwitje



Klein geaderd witje



Citroenvlinder

Argusvlinder (*Lasiommata megera*)

Deze soort vliegt laag bij de grond over bloemrijke graslanden en bermen, waar het vrouwtje op zoek is naar een gunstig plekje om haar eieren af te zetten. Vanaf kale plekken op de grond bewaken de mannetjes een territorium.

Boomblauwtje (*Celastrina argiolus*)

Op het eerste gezicht makkelijk te verwarren met het **Icarusblauwtje**. Maar het **Boomblauwtje** komt het meest in tuinen voor en vliegt van april tot september. Op de onderkant van de vleugels bevinden zich enkele zwarte stipjes. Het vrouwtje heeft meer zwart op de blauwe vleugel.

Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*)

Komt voor in bloemrijke graslanden en braakliggende terreinen. Het mannetje is intens blauw en heeft een dun zwart randje langs de vleugelrand. Het vrouwtje, dat bruinblauw is, vertoont aan de onderzijde eenzelfde tekening als het mannetje: bruine-oranje vlekjes langs de randen, terwijl over de hele oppervlakte zwarte stipjes met een wit randje waarneembaar zijn.

Bruin blauwtje (*Aricia agestis*)

Het **Bruin blauwtje** kan verward worden met het vrouwtje **Icarusblauwtje**. Je kunt ze samen aantreffen in één en hetzelfde leefgebied namelijk kruidenrijk grasland. De vlinder is weinig mobiel. Het is de kleinste vlinder van de blauwtjes. Er is geen blauwe gloed op de bovenvleugels. De buitenste franjeachtige rand is wit geblokt.

Bont zandoogje (*Pararge aegeria*)

Bovenzijde van de vleugels is donkerbruin met licht gele vlekken. Op de voorvleugel zit een oog. Op de achtervleugel zijn drie- of vier oogvlekken met een witte kern. Zij leven in een open vochtig bosrijk gebied en zonnen graag op of naast het pad. De mannetjes zijn herkenbaar aan hun territoriaal gedrag.

Groot koolwitje (*Pieris brassicae*), **Klein koolwitje** (*Pieris rapae*) en **Klein gaderd witje** (*Pieris napi*)

Veel voorkomende vlinders in tuinen, bermen en koolvelden. Er zijn slechts kleine verschillen tussen deze drie soorten. Wanneer het **Klein gaderd witje** uitrust, dan zie je duidelijke grijsgroene aders over de dichtgeklapte vleugel. Het **Groot koolwitje** heeft een duidelijker brede zwarte vlek dan het **Klein koolwitje**. Het **Klein koolwitje** komt hier het meeste voor.

Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*)

Het mannetje is herkenbaar aan de grote oranje vlek op de voorvleugel. Het **Oranjetipje** komt niet veel voor in West-Friesland omdat zijn favoriete landschap hier ontbreekt. Maar soms ziet men onverwachts een **Oranjetipje** in de tuin op **Look-zonder-look** of snoepend van de **Pinksterbloem** langs de slootkant. Vliegtijd: april en mei.

Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*)

Op ruige grasveldjes of op braakliggende terreintjes kun je deze kleine geelbruine vlinder tegenkomen. Soms rust hij uit op een grasstengel met dichtgeklapte vleugeltjes. Dan is nog wel het "oogje" zichtbaar op de onderkant van de voorvleugel.

Dagpauwoog (*Inachis io*), **Kleine vos** (*Aglais urticae*) en **Atalanta** (*Vanessa atalanta*)

Drie vlinders die je makkelijk kunt herkennen. Ze rusten graag met open vleugels op een windstille plek in het zonnetje. Alle drie leggen hun eitjes alleen op brandnetelbladeren. Komen voor in tuinen en parken. In opeenvolgende jaren kan hun aantal sterk wisselen.

Landkaartje (*Araschnia levana*)

De voorjaarsgeneratie van het **Landkaartje** heeft een oranjebruine bovenzijde met zwarte vlekken. De zomergeneratie is veel donkerder. De witte vlekken vormen een soort band over de beide vleugels. Het patroon aan de onderzijde lijkt net op een landkaart. Hij houdt van een beschutte plek en fladdert daarom in de buurt van struiken en bomen. De rups leeft op **Brandnetel**.

Zwartsprietdikkopje (*Thymelicus lineola*)

Een klein vlindertje met een plomp lijfje, dat in juli en augustus veel voorkomt in graslanden. In rust heeft het de voorvleugels samengeklapt en heeft daardoor een apart model.

Distelvlinder (*Vanessa cardui*)

Een grote vaal-oranje vlinder met zwart-witte vleugelpunten. Deze soort vind je veel bij allerlei soorten distels, waar ze nectar snoepen. Het is een bekende trekvlinder die in sommige jaren massaal aanwezig is.

Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*)

Slaat graag zijn vleugeltjes uit op schrale plekken zoals wegbermen, waar hij onrustig heen en weer vliegt. Mannetjes verdedigen hun eigen plek vooral als hier **Schapen-** of **Veldzuring** staat. Een diepe oranje kleur heeft hem de naam vuurvlinder bezorgd. Vliegtijd: mei tot in oktober.

Gehakkelde aurelia (*Polygonia c-album*)

Deze herken je heel goed aan zijn gekartelde vleugelrand. Het lijkt net of er allemaal hapjes uit zijn genomen. Een witte C zie je aan de onderkant van de vleugel. Hij fladdert nogal onrustig voor je uit en houdt van lekker beschutte zonnige plekjes, zoals een bosrand. Het is een van de eerste vlinders in het voorjaar en hij vliegt tot eind oktober.

Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*)

Deze vlinder valt op door zijn vorm en felle groengele kleur. Net zoals de **Distelvlinder** is het een goede vlieger en legt behoorlijke afstanden af. Aan zijn stevige vleugelslag kun je hem herkennen. Het is de eerste vlinder die in het voorjaar ontwaakt uit zijn winterslaap. Het afzetten van eitjes gebeurt vooral op **Vuilboom (Sporkehout)**.

Informatie over dit project is ook te vinden op onze website.

Deze vlinderkaart wordt je aangeboden door:

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

Postbus 123, 2000 MD Haarlem

E: noordholland@cultuurfonds.nl, T: (023) 514 46 67

Stichting Fondsen KNNV

Postbus 310, 3700 AH Zeist

E: secretaris@fondsen.knnv.nl

KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland

Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker

E: secretaris@hoorn.knnv.nl, T: (0229) 24 95 46, W: www.knnv.nl/hoorn

Met dank aan de **Vlinderstichting** voor het beschikbaar stellen van de afbeeldingen.

